ACTIVATE

Synergy Bioestimulantes

ACTIVATE

Aminoácidos
Estimulante de la producción

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Los principales beneficios de Active son:
• Incrementa la actividad enzimática y del metabolismo vegetal, con elevación de los procesos de respiración, transpiración y síntesis.
• Consigue un aumento del contenido de sustancias protéicas, carbohidratos, vitaminas y hormonas de crecimiento, favorece la precocidad de la floración, mejora el cuajado de frutos y aumenta la producción en las cosechas.
• Estimula el aumento de los procesos de reducción (síntesis), respecto de aquellos de oxidación (degradación).
• Estimula la formación de ácidos nucleicos asegurando la síntesis de los aminoácidos y su transformación en proteínas. Estimula el metabolismo glucídico y lipídico, aumentando la calidad de azúcar y grasas.
• Estimula la asimilación clorofílica optimizando la fotosíntesis, e intensifica el crecimiento del sistema radicular asegurando una mejor nutrición.

AMINOGRAMA

5% L-Cisteina , 1% entre (L-aspartico, L-threonina, L-Serina, L-ácido glutámico, L-glycina, L-lisna)

PRESENTACIONES

•Anfora de 5lt
•Anfora de 20lt





ACTIVATE

RECOMENDACIONES DE USO

El contenido en metales pesados de este producto está por debajo de los límites autorizados por Ley.

COMPOSICIÓN

ELEMENTO	CONCENTRACIÓN
AMINOACIDOS LIBRES	6,00% p/p
L-CISTEINA (precursor del AATC)	5,00% p/p
Ácido Fólico	0,10% p/v

DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVO	DÓSIS cc/ha	APLICACIÓN
Aguacate	100-200	3 desde la floración y cada 30 días
Ajo	125-150	3 desde la planta a 5 cm y cada 30 días
Algodón	250	Al inicio de la floración
	250- 500	30 días después de la floración
Arroz	400- 500	Un tratamiento en el ahijado
Cebolla	125- 150	3 desde planta a 10 cm y cada 30 días
Fresa	150	3 cada 10/15 días en floración
Maíz	200- 300	1 cuando la planta tiene 25/30 cm
Manzana y Pera	150	3 desde floración y cada 30 días
Hortícolas	50-100	2 entre floración y formación de fruto
Patata	150	Varios espaciados 15 días desde 5 hojas
Papaya	150	3 desde fruto con 5 cm y cada 30 días
Plátano	50-100	2 al inicio de floración y 15 días después
Tomate y Pimiento	200-250	2 uno al inicio y otro al final de floración
Vid	125- 150	2 al inicio y al final de floración
Olivas	100- 150	En primavera