KALIUMAG

Synergy Nutrición

KALIUMAG

Abono inorgánico. Estimulante del cuajado. Boro y molibdeno en forma mineral más fósforo procedente de fosfatos

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Abono corrector de las carencias de Boro y Molibdeno. Apto para su aplicación tanto en fertirrigación como por vía foliar. Actúa sobre la planta favoreciendo la aparición precoz de polen y una mayor viabilidad de la flor.

COMPOSICIÓN

ELEMENTO	CONCENTRACIÓN
Fósforo soluble en agua (P2O5)	24,00% p/p
Potasio soluble en agua (K2O)	11,00% p/p
Boro (en forma mineral)	8,00% p/p
Mo (en forma mineral)	4,00% p/p
Molibdato	7% p/p

El contenido en metales pesados de este producto está por debajo de los límites autorizados por Ley.

PRESENTACIONES

5kg





RECOMENDACIONES DE USO

• Dosis en pulverización foliar:
- Cucurbitáceas y hortícolas (tomate, pepino, calabacín, berenjena, etc…): 150-250 g/hl realizando un total de 2-3 aplicaciones; comenzando en prefloración antes de la aparición del primer ramillete floral hasta cuajado de frutos, repitiendo las aplicaciones cada 12-15 días.
- Ornamentales: 100-150 g/hl, aplicar en prefloración, para inducir floración y evitar la abscisión de botones florales.
- Cítricos, frutales, olivo y vid: 200-350 g/hl. En cítricos y frutales para mejorar el cuajado y desarrollo del fruto aplicar en prefloración, caída de pétalos, final del cuajado y engorde. En olivo aplicar antes de floración y durante engrosamiento del fruto. En vid realizar las aplicaciones antes de floración.

• Dosis en riego por goteo:
- Cucurbitáceas y hortícolas (tomate, pepino, calabacín, berenjena, etc…): 1-1,5 Kg/Ha con riego desde inicio de floración hasta final de cuajado con un intervalo de 12-15 días.
- Ornamentales: 1-1,5 Kg/Ha con riego para inducir la floración y evitar la abscisión de botones florales.
- Cítricos, frutales, olivo y vid: 2-3 Kg/Ha comenzando las aplicaciones antes de floración.

DOSIS DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS
Foliar	500 gr
Fertirrigación	1 Kg

KALIUMAG