

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Use el equipo de protección necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (overol o camisa de manga larga, pantalón, botas y guantes). No se aplique contra el viento. Descontamine su equipo de aplicación lavándolo con detergente. Lave perfectamente su equipo de protección con abundante agua y jabón. No reutilice este envase.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO
NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EL LACTANCIA Y ANIMALES
LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS
NO ALMACENE EN CASA HABITACIÓN
NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO
LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO
AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA
NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL
NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO
NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA"

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"

"PRIMEROS AUXILIOS"

Si la persona lo inhala, retire a la persona del lugar contaminado, recuéstela en un lugar bien ventilado y fresco. Asegúrese de que respira sin dificultad. Si no puede respirar acuéstelo de lado, retire secreciones y objetos que obstruyan el paso del aire y llame inmediatamente al médico.

Si hay contacto con la piel, quite la ropa contaminada y lave la piel con agua limpia y jabón.
Si la persona lo ingiere, y está plenamente consciente provea el vómito estimulando la garganta con el dedo.
Si penetra a los ojos, mantenga los párpados bien abiertos y lávelos con agua limpia durante 15 minutos.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

GRUPO QUÍMICO: Glucósido-lactonas macrocíclicas (producto de fermentación natural del hongo *Streptomyces avermiltis*)
ANTIDOTO: No se tiene antídoto específico.

TRATAMIENTO: Lavado gástrico en caso de ser ingerido, si presenta convulsiones administrar diazepam. CONTRAINDICADO: efedrina, epinefrina y compuestos relacionados.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Los primeros síntomas de intoxicación son la dilatación de la pupila, falta de coordinación y temblores.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

"DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA; NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS". MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".

EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUIFIFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".

EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO".
REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:

ESTE PRODUCTO ES ALTAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTAN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO

GARANTÍA

PROBELTE MÉXICO, S.A DE C.V. garantiza este producto de acuerdo a la descripción química de la etiqueta y es apto para los propósitos mencionados. El comprador asume todos los riesgos de uso y manejo que pudieran resultar de las instrucciones aquí expuestas.

"USO AGRICOLA"

ABINE 1,8% C.E.

Abamectina

Insecticida/ Concentrado emulsionable
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

| | |
|---|-----------|
| Ingrediente activo | % en peso |
| Abamectina: (avermectina) Mezcla de avermectinas B1 conteniendo no m-s de 80 % de avermectina B1a y no menos de 20% de avermectina B1b (Equivalente a 18 g de i.a. /L a 20°C) | 1.800 |
| Ingredientes Inertes | |
| Solvente y agentes emulsificantes | 98.200 |
| Total | 100.00 |

No. de Registro:

RSCO-INAC-0174-312-009-002



Toxico en caso de Ingestión Peligro

No. de lote: IMPRESO EN EL ENVASE

Fecha de fabricación: IMPRESO EN EL ENVASE

Fecha de caducidad: 2 años después de la fecha de elaboración

Contenido neto: **1 L**

HECHO EN ESPAÑA

FABRICADO POR:



Titular del registro e importador:

PROBELTE MÉXICO, S.A. de C.V.

Av. Américas No. 1297 - 207Col.

Providencia C.P. 44630,

Guadalajara, Jal.

Tel. 33 38 17 57 59/ 8



Sipcam Advan
México

DISTRIBUIDOR: ADVAN MÉXICO S.A. de C.V.

Ave. Roble 300 - Piso 15 Int. 1510

Col. Valle del Campestre, C.P. 66265,

San Pedro Garza García, Nuevo León, México,

Tel./fax (81) 8335-4544 - www.adván.com.mx

"USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS"
INSTRUCCIONES DE USO"
"SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN"

Insecticida traslaminar que actúa como un veneno estomacal y de contacto directo para el control de minador de la hoja en jitomate (tomate), chile bell y papa.

Utilícelo según las indicaciones. ABINE 1.8 % C.E. es efectivo en todos los estados larvales de los minadores de hoja. ABINE 1.8 % C.E. inmoviliza las plagas poco después de la exposición. La mortalidad máxima se alcanza entre los 3 y 7 días. Durante este periodo de alimentación y el daño de la plaga a la planta son mínimos. ABINE 1.8 % C.E. puede ser utilizado para tratamientos preventivos y/o curativos.

| CULTIVO | PLAGA | NOMBRE CIENTIFICO | DOSIS (L/ha) | |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|--|
| Papa (3) Chile Bell (3) Jitomate (tomate) (3) | Minador de la hoja | <i>Liriomyza spp.</i> | 0.3-1.0 | |
| Observaciones: | | | | Aplique tan pronto aparezcan los adultos, sus daños o sus huevecillos. Repita al menos con intervalo de 7 días o como sea necesario, para mantener el control. Use las dosis mayores en infestaciones altas. Asegure una buena cobertura de las plantas. |

() Intervalo de seguridad: Intervalo entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo.
Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para abrir el envase gire la tapa en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el sello de seguridad. Mida con una probeta graduada la cantidad a utilizar de ABINE 1.8 % C.E., vierta en el tanque de aspersión y agregue el agua hasta llenar el tanque, agite para lograr una mezcla homogénea y aplique.

Recomendaciones para jitomate:

No aplique más de 12 L de ABINE 1.8 % C.E. por ha por ciclo de cultivo

CONTRAINDICACIONES

Aplique cuando la velocidad del viento sea menor a 8 km y en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

FITOTOXICIDAD

No fitotóxico, sin embargo antes de usar el producto se recomienda aplicar primero un área pequeña para asegurarse que no ocurre fitotoxicidad.

INCOMPATIBILIDAD

No mezclar con CAPTAN ni con productos incompatibles con el aceite, si se quiere hacer mezcla hacer una prueba previa. Si desea hacer mezclas estas serán con productos que cuenten con registro en los cultivos aquí indicados.

"MANEJO DE RESISTENCIA":

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN, EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".



PELIGRO

