

Abine



ABINE

PROTEGE TUS CULTIVOS DE LOS ODIOSOS MINADORES



- Acción translaminar y sistémica.
- Actúa por contacto e ingestión.
- Reducción de la capacidad de ovoposición.
- De acción lenta y larga vida residual.

advan.com.mx


Sipcam **Advan**
México

¿Qué es ABINE?

Insecticida-acaricida natural de acción translaminar y sistémica localizada, eficaz en el control de todas las formas móviles de los insectos y los ácaros. Actúa por contacto e ingestión, impidiendo la transmisión de señales en las conexiones neuromusculares del insecto, paralizándolo irreversiblemente, dejan de alimentarse y provoca su muerte.

¿Cómo actúa?

Tiene dos formas de acción sobre minadores de hojas:

- Se trata de un producto de acción translaminar, por lo que penetra vía foliar y produce una excelente mortalidad en las minas existentes.
- Los residuos foliares recientes provocan una rápida reducción de la capacidad de oviposición de las hembras adultas expuestas a la sustancia. No es ovidica.

Dosis y modo de empleo

Pueden requerirse 3-4 días para alcanzar su máxima eficacia. En términos generales es un plaguicida de acción lenta y larga vida residual.



Composición porcentual

Ingredientes activos:

abacmentina (avermectina) mezcla de avermectinas 1,8 %, BI contenido no más 80% de avermectina BIa y no menos de 20% de avermectina BIb (equivalente a 18g de i.a/La 20°C).

CULTIVO	PLAGA	NOMBRE CIENTÍFICO	DOSIS (L/ha)
Papa (3)	Minador de la hoja	Liriomyza spp.	0.3-1.0
Chile Bell (3)			
Jitomate (tomate) (3)			
Observaciones	Aplice tan pronto aparezcan los adultos, sus daños o sus huevecillos. Repita al menos con intervalos de 7 días o como sea necesario, para mantener el control. Use las dosis mayores en infestaciones altas. Asegure una buena cobertura de las plantas.		

() Intervalo de seguridad: Intervalo entre la última aplicación y la recolección o cosecha del cultivo. Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 24 horas.